

Μηλοειδή



Ολοκληρωμένες λύσεις
φυτοπροστασίας



Ολοκληρωμένες λύσεις φυτοπροστασίας

Μηλοειδή



Προϊόν	Καλλιέργεια	Λήθαργος	Φούσκωμα μαπιών	Πράσινη κορυφή	Ρόδινη κορυφή (Λευκή στην αχλαδιά)	Άνθηση	Πτώση πετάλων	Εμφάνιση καρπιδίων	Αύξηση μεγέθους καρπών	Αρχές ωρίμανσης	PHI (ημέρες)
ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ	Antracol 70WP	M						80-150 λτ/στρ - M.E: 7-21, M.A.E:1 (συν. 3) M.A.E: 2 - 150 γρ/100λτ			-
	Copperfield 20WG	M-A	270-590 γρ/100λτ *								-
	Flint 50WG	M-A					7,5-10 γρ/100λτ - 100-150 λτ/στρ - M.E:10-12, M.A.E:3				14
	Flint max 75WG	M-A					20 γρ/100λτ - 150 λτ/στρ - M.E: 10-12, M.A.E:3				14
	Flint plus 64WG	M-A-K					125 γρ/100λτ - 100 λτ/στρ - ¹ M.E:8, M.A.E:3				35
	Folicur 25WG	M					40 γρ/100λτ - 100-150 λτ/στρ - M.E:14, M.A.E:2				35
	Luna experience 400SC	M-A					40-50 κ.εκ./100λτ - 50-150 λτ/στρ - M.E:7-10, M.A.E:2				14
	Serenade max WP	M-A					250-400 κ.εκ./στρ - 50-100 λτ/στρ - M.E:7, M.A.E:8				3
ΩΙΔΙΟ	Bayfidan 312SC	M		8 κ.εκ./100λτ - 200 λτ/στρ - M.A.E:4							21
	Flint 50WG	M-A				10 γρ/100λτ - 100-150 λτ/στρ - M.E:10-12, M.A.E:3					14
	Flint max 75WG	M				20 γρ/100λτ - 150 λτ/στρ - M.E: 10-12, M.A.E:3					14
	Flint plus 64WG	M-A-K				² 150 γρ/100λτ - 100 λτ/στρ - M.E:8, M.A.E:3					35
	Luna experience 400SC	M-A				40-50 κ.εκ./100λτ - 50-150 λτ/στρ - M.E:7-10, M.A.E:2					14
ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ ΛΑΙΜΟΥ & ΡΙΖΩΝ	Aliette 80WG	M				250 γρ/100λτ - 100-200 λτ/στρ - M.A.E:4					3
ΑΛΤΕΡΝΑΡΙΑ	Flint max 75WG	M				20 γρ/100λτ - 150 λτ/στρ - M.E: 10-12, M.A.E:3					14
	Luna experience 400SC	M-A				40-50 κ.εκ./100λτ - 50-150 λτ/στρ - M.E:7-10, M.A.E:2					14
ΣΤΕΜΦΥΛΙΟ	Flint 50WG	A				15 γρ/στρ - 100 λτ/στρ - M.E:10-12, M.A.E:3					14
	Flint max 75WG	A				20 γρ/100λτ - 150 λτ/στρ - M.E: 10-12, M.A.E:3					14
	Flint plus 64WG	A-K				187 γρ/100λτ - 100 λτ/στρ - M.E: 8, M.A.E: 3					35
	Luna experience 400SC	M-A				40-50 κ.εκ./100λτ - 50-150 λτ/στρ - M.E: 7-10, M.A.E: 2					14
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ	Serenade max WP	M-A				250-400 κ.εκ./στρ - 50-100 λτ/στρ - M.E: 7, M.A.E: 4					3
	Copperfield 20WG	M-A	270-625 γρ/100λτ *								-
ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ	Copperfield 20WG	M-A	270-625 γρ/100λτ *								-
ΣΕΠΤΟΡΙΩΣΗ, ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ	Copperfield 20WG	M-A	270-590 γρ/100λτ *								-
ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ	Envidor 240SC	M-A						³ 40 κ.εκ./100λτ - 150 λτ/στρ - M.A.E:1			14
ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ	Calypso 480SC	M-A						⁴ 20 κ.εκ./100λτ - 100 λτ/στρ - M.A.E:1			14
	Decis protech 15EW & Decis 25EC	M-A-K-M						50-80 κ.εκ./100λτ το 15EW & 30-50 κ.εκ./100λτ το 25EC - 100-140 λτ/στρ - M.E:14, M.A.E:2			7
	Runner 240SC	M-A						40 κ.εκ./100λτ - 100-180 λτ/στρ - M.E:14-21, M.A.E:3			14
ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ	Calypso 480SC	M-A						⁵ 20 κ.εκ./100λτ - 100 λτ/στρ - M.A.E:1			14
	Runner 240SC	M-A						40 κ.εκ./100λτ - 100-180 λτ/στρ - M.E:14-21, M.A.E: 3			14
ΑΦΙΔΕΣ	Calypso 480SC	M-A						⁶ 20 κ.εκ./100λτ - 100 λτ/στρ - M.A.E:1			14
	Decis protech 15EW & Decis 25EC	M-A-K-M						50-80 κ.εκ./100λτ το 15EW & 30-50 κ.εκ./100λτ το 25EC - 100-140 λτ/στρ - M.E:14, M.A.E:2			7
	Movento 1500D	M-A						60 κ.εκ./100λτ ⁷ - 50-150 λτ/στρ - M.E:14-21, M.A.E:2			21
ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ	Movento 1500D	M					100 κ.εκ./100λτ ⁸ - 50-150 λτ/στρ - M.E:14-21, M.A.E:2			21	
ΨΥΛΛΑ	Confidor 200SL	A						60 κ.εκ./στρ - 150 λτ/στρ - M.A.E:1			7
	Decis protech 15EW & Decis 25EC	M-A-K-M						80 κ.εκ./100λτ το 15EW & 50 κ.εκ./100λτ το 25EC - 100 λτ/στρ - M.E:14, M.A.E:2			7
	Movento 1500D	A						100 κ.εκ./100λτ ⁹ - 50-150 λτ/στρ - M.E:14-21, M.A.E:2			21
ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ	Movento 1500D	M-A					100 κ.εκ./100λτ ⁹ - 50-150 λτ/στρ - M.E:14-21, M.A.E:2			21	
ΦΥΛΛΟΔΕΤΕΣ	Runner 240SC	M-A						40 κ.εκ./100λτ - 100-180 λτ/στρ - M.E:14-21, M.A.E:3			14
	Decis protech 15EW & Decis 25EC	M-A-K-M						60 κ.εκ./100λτ 15EW & 35 κ.εκ./100λτ 25EC			7
ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	Decis trap	M-A-K-M						5-8 παγίδες ανά στρέμμα - M.A.E:1			-
ZIZANIA	Basta 15SL ⁹	M-A						500 κ.εκ./στρ - 50 λτ/στρ - M.A.E:2			14

* 100-200 λτ/στρ, M.A.E:3

M (Μηλιά) - **A** (Αχλαδιά) - **K** (Κυδωνιά) - **M** (Μουσμουλιά)

M.E: Μεσοδιάστημα Εφαρμογών, **M.A.E:** Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο, **PHI:** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

- Σε περιπτώσεις εφαρμογής για την αντιμετώπιση μόνο του φουζικλαδίου, ο M.A.E είναι δύο (2) με M.E 8 ημερών
- Στην καλλιέργεια της μηλιάς να χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση του ωιδίου, μόνο σε περίπτωση ταυτόχρονης καταπολέμησης και του φουζικλαδίου
- Καθολικός ψεκασμός της καλλιέργειας με την έναρξη του 2ου κύματος προσβολής και σύμφωνα με το όριο οικονομικής ζημιάς
- Εφαρμογές σύμφωνα με τις Γεωργικές Προειδοποιήσεις
- Εφαρμογή στο μέγιστο της εξόδου των ακαθάρτων από τα βομβύκια. Η 1η γενεά συμπίπτει με το τέλος της άνθησης - πτώσης των πετάλων

- Προληπτικά (εκτός της Arhis romi) στο στάδιο της πράσινης κορυφής σε συνδυασμό με θερινό λάδι 2,5-3%. Κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής στο στάδιο των κλειστών μπουμπούκιών ή μετά την άνθηση-πτώση πετάλων έως την ωρίμανση
- Με ελάχιστη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα
- Με ελάχιστη δόση 100 κ.εκ. σκευάσματος ανά στρέμμα
- Να εφαρμόζεται μόνο κατά λωρίδες ή κατά σημεία





Bayer

Bayer Ελλάς ABEE
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Πριν τη χρήση διαβάστε τις προειδοποιητικές φράσεις
και τα σύμβολα που αναγράφονται στην ετικέτα.

**ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ.
ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**