

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Τομέας Επιστήμης Γεωργίας
Σωρού 18-20, 15125 Μαρούσι
Τηλ: 210 6166000, Fax: 210 6109100
www.cropscience.bayer.gr



ΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΡΟΠΟ.
ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΝΗΦΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ.
Πριν τη χρήση διαβάστε τις προειδοποιητικές φράσεις
και τα σύμβολα που αναγράφονται στην ετικέτα.

Πυρηνόκαρπα



Ολοκληρωμένες λύσεις
φυτοπροστασίας



Ολοκληρωμένες λύσεις φυτοπροστασίας

Πυρηνόκαρπα



Βλαστικό στάδιο	Καλλιέργεια	Λήθαργος	Φούσκωμα ματιών	Ρόδινη ή λευκή κορυφή	Άνθηση	Πτώση πετάλων	Εμφάνιση καρπιδίων	Αύξηση μεγέθους καρπών	Αρχές ωρίμανσης	Ωρίμανση	PHI (ημέρες)
ΩΔΙΟ	Flint 50WG	P-N-B					15 γρ/100λτ - 100 λτ/στρ - M.E: 10-14, M.A.E:3				7
	Flint max 75WG	P-N-B-Δ-K					20 γρ/100λτ - 150 λτ/στρ - M.E: 10-12, M.A.E:2 (Δ-K: 3 εφ)				7
	Folicur 25WG	P-N					50 γρ/100λτ - 150 λτ/στρ - M.E:14, M.A.E:2				7
	Luna Experience 400SC	P-N-B-K-Δ'					33,5 κ.εκ./100λτ - 150 λτ/στρ - M.E:14, M.A.E:3 ²				3
ΜΟΝΙΑΙΑ	Serenade max WP	P-N-B-Δ-K						250-400 γρ/100λτ - 50-100 λτ/στρ - M.E: 7, M.A.E:4			3
	Luna Experience 400SC	P-N-B-K-Δ'					42-50 κ.εκ./100λτ - 150 λτ/στρ - M.E:7-14, M.A.E: 2 ²				3
	Flint max 75WG	P-N-B-Δ-K					20 γρ/100λτ - 150 λτ/στρ - M.E: 12-14 ³ , M.A.E: 2 (Δ-K: 3 εφ)				7
	Folicur 25WG	P-N					50-75 γρ/100λτ - 100-150 λτ/στρ - M.E:14, M.A.E:2 ⁴				7
	Teldor 50WG	K						100-150 γρ/στρ - 150-250 λτ/στρ			1
	Copperfield 20WG	P-N-B		270 - 425 γρ/100λτ ⁵	100-120 λτ/στρ	M.A.E:4					-
ΞΕΩΔΑΣΚΟΣ	Flint max 75WG	P-N-B-Δ-K					20 γρ/100λτ - 150 λτ/στρ - M.E: 12-14, M.A.E:2 (Δ-K: 3 εφ)				7
	Copperfield 20WG	P-N	270-425 γρ/100λτ	100-120 λτ/στρ	M.A.E:4						-
ΚΟΡΥΝΕΟ	Copperfield 20WG	P-N-B-K	270-425 γρ/100λτ ⁶	100-120 λτ/στρ	M.A.E:4 ⁷						-
ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΩΣΗ	Copperfield 20WG	P-N	270-425 γρ/100λτ	100-120 λτ/στρ	M.A.E:4						-
ΒΟΤΡΥΤΗΣ	Teldor 50WG	K						100-150 γρ/στρ - 150-250 λτ/στρ			1
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ	Serenade max WP	P-N-B-Δ-K					250-400 γρ/100λτ - 50-100 λτ/στρ - M.E: 7, M.A.E:4				3
ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ	Copperfield 20WG	K	325-425 γρ/100λτ	100-120 λτ/στρ	M.A.E:4						-
ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΚΟΣ	Copperfield 20WG	P-N	270 - 425 γρ/100λτ	100-120 λτ/στρ	M.A.E:4						-
ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ	Envidor 240SC	P-N-B-Δ-K					40 κ.εκ./100λτ - 150 λτ/στρ - M.A.E:1				14
ΑΦΙΔΕΣ	Calypso 480SC	P-N-B-K					15 κ.εκ./100λτ ⁸ - 100-150 λτ/στρ - M.A.E:1				14
	Confidor 200SL	P					25-30 κ.εκ/ 100λτ - 150-250 λτ/στρ - M.E: 28, M.A.E:2				14
	Decis Protech 15EW & Decis 25 EC	P-N-B-Δ-K-BY					50-80 κ.εκ./100λτ EW15 - 30-50 κ.εκ/100λτ EC25 100-140 λτ/στρ - M.A.E:1				7
	Movento 1500D	P-N-B-Δ-K					60 κ.εκ./στρ ⁹ - 50-150 λτ/στρ - M.E:14-21, M.A.E:2				21
ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ	Movento 1500D	P-N-B-Δ					100 κ.εκ./στρ ¹⁰ - 50-150 λτ/στρ - M.E:14-21, M.A.E:2				21
ΦΥΛΛΟΔΕΤΕΣ	Runner 240SC	P-N-B					40 κ.εκ./100λτ ¹¹ - 150-180 λτ/στρ - M.E:14-21, M.A.E:3				7
	Decis Protech 15EW & Decis 25 EC	P-N-B-Δ-K-BY					60 κ.εκ./100λτ 15EW - 35 κ.εκ./100λτ 25EC 100-140 λτ/στρ - M.A.E:1				7
ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ	Decis Protech 15EW & Decis 25 EC	K					65-80 κ.εκ./100λτ 15EW - 40-50 κ.εκ 25EC 100-140 λτ/στρ - M.A.E:1				7
ΑΝΑΡΣΙΑ	Decis Protech 15EW & Decis 25 EC	P-N-B-Δ-K-BY					60 κ.εκ./100λτ 15EW - 35 κ.εκ./100λτ 25EC 100-140 λτ/στρ - M.A.E:1				7
ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	Decis Protech 15EW & Decis 25 EC	P-N-B-Δ-K-BY					80 κ.εκ./100λτ 15EW - 50 κ.εκ./100λτ 25EC 100-140 λτ/στρ - M.A.E:1				7
	Decis trap	P-N-B-Δ-K					5 - 8 παγίδες ανά στρέμμα - M.A.E: 1				-
ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ	Decis Protech 15EW & Decis 25 EC	P-N-B-Δ-K-BY					50-80 κ.εκ./100λτ 15EW - 30-50 κ.εκ/10λτ 25EC 100-140 λτ/στρ - M.A.E:1				7
ZIZANIA (ΑΓΡΟΣΤΩΔΗ & ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ)	Basta 15SL	P-N-B-Δ					500 κ.εκ./στρ - 50 λτ/στρ - M.A.E:2 ¹²				14

P (Ροδακινιά) - **N** (Νεκταρινιά) - **B** (Βερικοκιά) - **Δ** (Δαμασκηλιά) - **K** (Κερασιά) - **BY** (Βουσσινιά)

M.E: Μεσοδιάστημα Εφαρμογών, **M.A.E:** Μέγιστος Αριθμός Εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο, **PHI:** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

- Η χρήση στην Δαμασκηλιά θα χορηγηθεί αφού πρώτα θεσπιστούν τα ανάλογα MRL.
- Η μέγιστη ποσότητα προϊόντος ανά καλλιεργητική περίοδο να μην ξεπερνάει τα 200 κ.εκ./στρέμμα.
- Πριν τη συγκομιδή το μεσοδιάστημα εφαρμογών είναι 7 ημέρες.
- Ο μεγάλος όγκος νερού (150 λτ/στρ) να χρησιμοποιείται με τη χαμηλή δόση σκευάσματος (50 γρ. σκ./100 λτ) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 75 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα.
- Στην βερικοκιά η δόση είναι 325-410 γρ/100λτ και ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο τρεις (3).
- Στην βερικοκιά η δόση είναι 325-410 γρ/100λτ και στην κερασιά 325-425 γρ/100λτ

- Στην βερικοκιά ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο είναι τρεις (3).
- Προληπτικά σε συνδυασμό με θερινό λάδι 2% μέχρι το στάδιο της ρόδινης κορυφής. Κατασταλτικά με την εμφάνιση της προσβολής μετά την άνθηση και πτώση των πετάλων έως την ωρίμανση.
- Με ελάχιστη δόση 60 κ.εκ σκευάσματος ανά στρέμμα.
- Με ελάχιστη δόση 100 κ.εκ σκευάσματος ανά στρέμμα.
- Πρώτη εφαρμογή κατά την έναρξη της εναπόθεσης των ωών (περίπου 7 ημέρες από την έναρξη της σύλληψης των ακμαίων στις φερομονικές παγίδες) και σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.
- Να εφαρμόζεται μόνο κατά λωρίδες ή κατά σημεία.

