

VAPOR GARD®

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε. Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / ατμούς / εκνεφώματα. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας. Μην χρησιμοποιείτε δόσεις μεγαλύτερες και πυκνότερες από τις κανονικές. Μην αδειάζετε το περιεχόμενο σε αρδευτικούς ή υδρευτικούς αγωγούς ή πηγάδια. Καταστρέψατε τα κενά μέσα συσκευασίας.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον, να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί γύρω από τις μέλισσες με ελάχιστες ζημιές.

«Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας»

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Συνδυάζεται με όλα τα γνωστά γεωργικά σκευάσματα.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:

Για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, πρέπει ο ψεκασμός με το VAPOR GARD να γίνεται τουλάχιστον 1 ώρα πριν από προβλεπόμενη βροχή.

Αμέσως μετά τον ψεκασμό το δοχείο, τα λάστιχα και τα μπκε πρέπει να ξεπλένονται με άφθονο νερό.

Εάν συμβεί ψεκαστικό υγρό με VAPOR GARD να πέσει σε επιφάνειες όπου δεν το θέλουμε, τζάμια, εργαλεία, οχήματα, κλπ. αν δεν έχει ακόμα στεγνώσει μπορούμε να το αφαιρέσουμε με νερό. Αν έχει στεγνώσει καθαρίζουμε με πετρέλαιο.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε χώρο δροσερό, καλά αεριζόμενο. Σε αυτές τις συνθήκες το σκεύασμα παραμένει σταθερό τουλάχιστον για δύο (2) χρόνια.

Αριθ. Παρτίδας:

Ημ/νία Παρασκευής: Βλέπε φιάλη

Ημ/νία Λήξης:

Εγγυημένη σύνθεση: Πινολίνη : 96% β/ο
Βοηθ. ουσίες : 4% β/β

Πυκνό αντιδιαπνευστικό σκεύασμα πινολίνης

Xi



ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

N



Επικίνδυνο για
το περιβάλλον

Ερεθιστικό για το δέρμα.

Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση
σε επαφή με το δέρμα.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς
επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ

* Προϊόν του οίκου

MILLER CHEMICAL & FERTILIZERS CORPORATION, ΗΠΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: LANCES LINK HELLAS Ltd.

Περιεχόμενο
1 λίτρο

Διανομή: **ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ,**
Μεσογείων 335,
15231 Χαλάνδρι
Αθήνα

Συσκευαστής: **K&N Ευθυμιάδη Α.Β.Ε.Ε.**, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :

ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΕΙΣ :

Το VAPOR GARD προστατεύει κατά τις μεταφυτεύσεις τα νεαρά δέντρα (εσπεριδοειδή, ελιές, δασοκομικά, καλλωπιστικά) και τα φυτά (καπνύ, ντομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς, λουλουδιών) από την απώλεια υγρασίας.

Ψεκάσουμε τα νεαρά δέντρα ή φυτά μέχρι απορροής πριν τη μεταφύτευση με γαλάκτωμα **2 έως 2,5%** ή τα εμβαπτίζουμε στο ίδιο γαλάκτωμα αμέσως μόλις τα βγάλουμε απ' τη γη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΞΗΡΑΣΙΑ :

Η προστατευτική μεμβράνη της ΠΙΝΟΛΙΝΗΣ που σχηματίζει το VAPOR GARD προστατεύει τα φυτά και τους καρπούς τους από την ξηρασία και τα κύματα καύσωνα. Η χρήση αυτή του VAPOR GARD είναι ιδιαίτερα πολύτιμη στις ξηρικές καλλιέργειες : ξηρικοί ελαιώνες, αμυγδαλιές, καλλωπιστικά, δασικά, καθώς και όταν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα για το πότισμα σε όλες τις καλλιέργειες. Ψεκασμοί όλου του φυλλώματος μέχρι απορροής στη δόση **0,5-1%**.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ:

Πορτοκάλια Λεμόνια : Ψεκάσουμε τους καρπούς με VAPOR GARD 1-4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή στη δόση **1%** ή μετά τη συγκομιδή εμβαπτίζουμε τους καρπούς σε διάλυμα **1-2%**.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΨΥΧΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΜΥΡΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ:

Ψεκάζοντας τα φυτά, αειθαλή δέντρα, θάμνους, παρτέρια στο τέλος του φθινοπώρου με VAPOR GARD τα προστατεύουμε από το ψύχος ακόμα και από τους ελαφρούς παγετούς, καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Στις περιοχές κοντά στη θάλασσα, οι ψεκασμοί με VAPOR GARD απομονώνουν το φύλλωμα και προστατεύουν από τα σταγονίδια του αλμυρού νερού που βλάπτουν και εμποδίζουν την ομαλή ζωή και ανάπτυξη των φυτών.

Δόση : **2,5%-3% VAPOR GARD.**

ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ : Ψεκάσουμε τα λουλούδια πριν τα κόψουμε ή τα εμβαπτίζουμε μόλις τα κόψουμε σε γαλάκτωμα VAPOR GARD. Τους προσδίνουμε έτσι καλύτερη εμφάνιση, ζωηρότερα χρώματα και τους εξασφαλίζουμε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Δόση **2 έως 2,5%**.

ΚΕΡΑΣΙΑ : Για προστασία από το σκάσιμο του καρπού. Ψεκασμός 20-30 ημέρες πριν από την προβλεπόμενη συγκομιδή με δόση **0,5%**.

ΡΟΔΑΚΙΝΑ/ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ: Για πρωίμηση, αύξηση του μεγέθους των καρπών και βελτίωση του χρώματος. Δόση **0,5%**.

ΠΑΤΑΤΑ: Για αύξηση των αποδόσεων και ομοιομορφία κονδύλων. Ψεκασμός μία εβδομάδα μετά την ανθοφορία. Δόση **1 λίτρο στο στρέμμα.**

ΑΜΠΕΛΙ : για ειδικές χρήσεις:

α. Προστασία από τον καύσωνα. Δόση **0,5-1%** δέκα ημέρες πριν από τον προβλεπόμενο καύσωνα.

β. Στη σουλτανίνα για πρωίμηση, ψεκασμός κατά το γυάλισμα και πριν κλείσει το σταφύλι.

Δόση **0,5%**.

γ. Για συντήρηση και παράταση του χρόνου συγκομιδής, ψεκασμός πριν από τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου με δόση **0,25%**.

Ο ψεκασμός μπορεί να επαναληφθεί και μετά από 20-25 ημέρες.



0114

290x153