

Προϊόντα ζιζανιοκτονίας για την καλλιέργεια των σιτηρών
από την **K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ**

CARMINA MAX



 **SARACEN®**



 **SWORD®**



 **Lentemul® 60 SL**



LIMCPA® Forte 50SL



 **CIRРАН®**



Η εταιρία Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ σας παρουσιάζει τη σειρά προϊόντων

ζιζανιοκτονίας για την καλλιέργεια των σιτηρών

CARMINA MAX

ΑΑΔΑ: 70171/01-09-16

**Η σωστή εκκίνηση
για μεγάλες αποδόσεις!**

Μίγμα δύο δραστικών ουσιών (**Chlorotoluron** και **Diflufenican**) με συμπληρωματικό και συνεργιστικό τρόπο δράσης για τον **αποτελεσματικό έλεγχο της ήρας και ευρέως φάσματος πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά.**

Εφαρμόζεται προφυτωτικά της καλλιέργειας και δρα τόσο στα ζιζάνια που έχουν φυτρώσει κατά τη στιγμή της εφαρμογής, όσο και σε αυτά που φυτρώνουν σε διάστημα μερικών εβδομάδων μετά την εφαρμογή.

Αποτελεί **σημαντικό εργαλείο διαχείρισης της ανθεκτικότητας δύσκολων ζιζανίων** (ήρας, άγριου σιναπιού, κ.λ.π.).



ήρα

SARACEN®

ΑΑΔΑ: 70105/11-02-15

**Παίρνει άριστα
στην καταπολέμηση
της κολλητσίδας!**

Διασυστηματικό μεταφυτωτικό ζιζανιοκτόνο με βάση το **Florasulam** για την **καταπολέμηση της κολλητσίδας και άλλων ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων** σε καλλιέργειες σιτηρών.

Το Florasulam δρα αναστέλλοντας τη δράση του ενζύμου οξικογαλακτική συνθεάση (acetolactate synthase-ALS).



Κολλητσίδα

SWORD®

ΑΑΔΑ: 7950/01-03-11

**Αξιόπιστο ενάντια
στα κύρια αγρωστώδη
ζιζάνια ακόμα και στις
πιο δυσμενείς
κλιματολογικές συνθήκες!**

Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος με βάση το **Clodinafop-propargyl**.

Εφαρμόζεται μεταφυτωτικά για την **καταπολέμηση της αγριοβρώμης, της ήρας και άλλων αγρωστωδών ζιζανίων στο σιτάρι.**

Απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και τα **αποτελέσματα** της δράσης του είναι **άμεσα ορατά**, λόγω της εξαιρετικής ικανότητας διείσδυσής του στους φυτικούς ιστούς. Η πλήρης καταστροφή των ζιζανίων επέρχεται 2-3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

Είναι **αποτελεσματικό σε πληθώρα κλιματολογικών συνθηκών**, ακόμα και στις πιο δυσμενείς.



Αγριοβρώμη

Lentemul® 60 SL

ΑΑΔΑ: 7528/25-01-08

**Η οικονομική λύση
στον έλεγχο των
πλατύφυλλων ζιζανίων!**

Μεταφυτωτικό, διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο με βάση το 2,4-D οξύ για την **καταπολέμηση άγριου σιναπιού, κίρσιου και άλλων πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά.**

Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα των ζιζανίων και έχει δράση παρόμοια με αυτή των φυσικών αυξινών.

Το 2,4-D οξύ είναι υπό μορφή άλατος διμεθυλαμίνης, προσδίδοντας στο σκεύασμα **χαμηλότερη πτητικότητα** συγκριτικά με τα σκευάσματα 2,4-D εστερικής μορφής.



Άγριο Σινάπι

LIMCPA® Forte 50SL

ΑΑΔΑ: 70166/21-07-16

**Η σταθερή αξία
ενάντια στα
πλατύφυλλα ζιζάνια!**

Μεταφυτωτικό, διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο με βάση το **MCPA οξύ** για την **καταπολέμηση της παπαρούνας και άλλων πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά.**

Έχει δράση παρόμοια με αυτή των φυσικών αυξινών. Η μορφή του MCPA οξέος που εμπεριέχεται στο LIMCPA Forte είναι άλας διμεθυλαμίνης και προσδίδει στο σκεύασμα σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

- λιγότερο αλκαλικό pH (7,5-9,5) και **μεγαλύτερη ικανότητα διάλυσης σε χαμηλές θερμοκρασίες**, συγκριτικά με τα ζιζανιοκτόνα MCPA που κυκλοφορούν στην αγορά υπό μορφή άλατος καλίου

- **χαμηλότερη πτητικότητα** συγκριτικά με τα MCPA εστερικής μορφής.



Παπαρούνα

CIRRAN®

ΑΑΔΑ: 70297/12-10-18

**Ο συνδυασμός
που «σκοτώνει»
τα σημαντικότερα
πλατύφυλλα ζιζάνια!**

Διασυστηματικό εκλεκτικό μεταφυτωτικό ζιζανιοκτόνο, για την **καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά.**

Είναι προϊόν έρευνας και ανάπτυξης της Nufarm, που **συνδυάζει τα δύο ευρέως χρησιμοποιούμενα μόρια** στην καταπολέμηση των πλατύφυλλων ζιζανίων, το 2,4D οξύ και το MCPA οξύ.

Παρουσιάζει **χαμηλή πτητικότητα** λόγω της μορφής άλατος διμεθυλαμίνης των οξέων που περιέχει, μειώνοντας έτσι τις απώλειες και το φαινόμενο «drift» κατά την εφαρμογή.

Εμφανίζει **ενισχυμένη δράση στα πολυετή πλατύφυλλα ζιζάνια**, λόγω της παρουσίας του MCPA στο μίγμα.




Κίρσιο







ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ				ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ						
ΣΚΕΥΑΣΜΑ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΧΗΜΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (HRAC GROUP)	ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Κ.ΕΚ./ΣΤΡ) MAX	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (ΛΙΤΡΑ/ΣΤΡ)	ΖΙΖΑΝΙΑ ΣΤΟΧΟΙ		
								ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ	ΜΕΤΡΙΩΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ	ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ
CARMINA MAX	Chlorotoluron 60% β/ο / Diflufenican 4% β/ο	Φαινολουρίες (C2)/ Καρβοξαμίδια (F1)	Αναστολέας της φωτοσύνθεσης στο φωτοσύστημα II / Αναστολέας της σύνθεσης των καρροτενοειδών στο στάδιο του αποκορεσμού του φυτοεπίου (PDS)	ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ Σιτάρι (μαλακό και σκληρό), Κριθάρι	ΠΡΟΦΥΤΡΩΤΙΚΑ (BBCH00)	250	15-30	ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ: ΑΓΡΙΟΠΑΝΣΕΣ, ΑΓΡΙΟ ΣΙΝΑΠΙ, ΑΛΧΕΜΙΛΑ, ΑΝΘΕΜΙΔΑ, ΑΡΑΒΙΔΩΦΗ, <i>INULA VISCOSA</i> , ΚΕΡΑΣΤΙΟ, <i>MATRICARIA RESUTITA</i> , <i>MIBORA MINIMA</i> , ΜΥΟΣΩΤΙΣ, ΡΑΝΟΥΝΚΟΥΛΟΣ, ΧΑΜΟΜΗΛΙ ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ: ΑΝΕΜΟΧΟΡΤΟ, ΗΡΑ, ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΗΡΑ, ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΑ, ΤΡΑΧΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΑ	ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ: ΡΑΠΑΝΙΔΑ ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ: ΑΛΕΠΟΝΟΥΡΑ	
SARACEN SC	Florasulam 5% β/ο	Τριαλοζοπυριμιδίνες-Σουλφοναμίδια (B)	Αναστολέας της δράσης της οξικογαλακτικής συνθετάσης (acetolactate synthase-ALS)	ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΑ ΣΙΤΗΡΑ Σιτάρι (μαλακό και σκληρό), Κριθάρι Χειμερινή Σίκαλη, Triticale	ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΚΑΛ/ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ Ο 2ος ΚΟΜΒΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 2ΕΚ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ. ΑΠΟ ΤΟ 2ο ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΚΑΛ/ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 3ο ΑΔΕΛΦΙ.	10-15	20-40	ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ: ΑΓΡΙΑ ΡΟΚΑ, ΑΝΘΕΜΙΣ, ΑΓΡΙΟΒΙΚΟΣ, ΚΑΨΕΛΛΑ, ΚΟΛΛΗΤΣΙΔΑ, ΜΠΙΦΟΡΑ, ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ, ΡΑΠΑΝΙΔΑ, ΣΙΝΑΠΙ, ΣΤΕΛΛΑΡΙΑ, ΧΑΜΟΜΗΛΙ		
SWORD 240EC	Clodinafop-propargyl 24% β/ο	Αρυλοφαινοξυαλκανοϊκά (A)	Αναστολέας της δράσης της καρβοξυλάσης του ακετυλο-συνενζύμου A (ACCase).	ΣΙΤΗΡΑ Σιτάρι (μαλακό και σκληρό)	ΑΠΟ ΤΟ 3ο ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΚΑΛ/ΕΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΛΦΩΜΑΤΟΣ	17 20 25	20-40	ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ: ΑΓΡΙΟΒΡΩΜΗ, ΑΛΕΠΟΝΟΥΡΑ ΦΑΛΑΡΗ, ΜΙΛΙΟ ΗΡΑ		ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ: ΚΟΙΝΗ ΠΟΑ, ΑΓΡΙΟΚΡΙΘΑΡΟ, ΒΡΩΜΟΣ
LENTEMUL 60SL	2,4-D οξύ 60% (υπό μορφή 2,4-D άλατος διμεθυλαμίνης 72,24% β/ο)	Φαινοξυαλκανοϊκά (O)	Δράση συνθετικής αυξίνης	ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη	ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΛΦΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΛΑΜΩΜΑΤΟΣ (1ο ΚΟΜΒΟ)	85-120 120-150	40-60	ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ: ΑΓΡΙΟΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΑΓΡΙΟ ΣΙΝΑΠΙ, ΑΛΜΥΡΙΔΙ, ΑΣΠΙΡΑΓΚΑΘΟ, ΒΛΗΤΑ, ΖΩΧΟΣ, ΗΜΕΡΟ ΣΙΝΑΠΙ, ΘΛΑΣΠΙ, ΚΑΨΕΛΛΑ, ΛΟΥΒΟΥΔΙΑ, ΣΙΣΥΜΠΡΙΟ, ΤΑΤΟΥΛΑΣ, ΡΑΝΟΥΝΚΟΥΛΟΣ, ΡΑΠΑΝΙΔΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ: ΚΙΡΣΙΟ, ΛΑΠΑΘΑ, ΠΕΡΙΠΛΟΚΑΔΑ		
LIMCPA FORTE 50SL	MCPA οξύ 50% β/ο (υπό μορφή άλατος Διμεθυλαμίνης 61,24%)	Φαινοξυαλκανοϊκά (O)	Δράση συνθετικής αυξίνης	ΣΙΤΗΡΑ Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη, Βρώμη, Τρικήλιε	ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΛΦΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΩΜΑΤΟΣ	160-200	40-60	ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ: ΑΓΡΙΟ ΓΟΓΓΥΛΙ, ΒΛΗΤΟ ΤΡΑΧΥ, ΒΟΥΡΛΟ ΜΙΚΡΟ, ΓΕΡΑΝΙΑ, ΔΩΔΕΚΑΝΘΙ, ΖΩΧΟΣ, ΚΑΠΠΟΧΟΡΤΟ, ΚΑΡΔΑΜΙΝΑ, ΚΑΨΕΛΛΑ, ΛΑΜΙΟ ΠΟΡΦΥΡΟ, ΛΟΥΒΟΥΔΙΑ, ΛΟΥΒΟΥΔΙΑ ΠΟΛΥΣΠΕΡΜΗ, ΜΑΡΤΙΑΚΟΣ, ΜΥΡΩΝΙ, ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ ΚΟΙΝΗ, ΠΕΝΤΑΝΕΥΡΑ, ΡΟΚΑ, ΣΠΕΡΓΟΥΛΑ	ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ: ΑΓΡΙΟΝΤΟΜΑΤΙΑ, ΑΓΡΙΟΡΑΔΙΚΟ, ΑΝΑΓΑΛΛΙΔΑ, ΑΝΘΕΜΙΔΑ, ΒΕΡΟΝΙΚΕΣ, ΚΕΡΑΣΤΙΟ, ΚΙΡΣΙΟ, ΛΑΠΑΘΑ, ΠΕΡΙΚΟΚΛΑΔΑ, ΠΙΚΡΑΛΙΔΑ, ΠΟΛΥΚΟΜΠΙ, ΡΑΝΟΥΝΚΟΥΛΟΙ, ΡΑΠΑΝΙΔΑ, ΧΑΜΟΜΗΛΙ	
CIRРАН SL	2,4-D οξύ 34,5 % β/ο (υπό μορφή άλατος DMA 41,54%) / MCPA οξύ 34,5% β/ο (υπό μορφή άλατος DMA 42,26%)	Φαινοξυαλκανοϊκά (O)	Δράση συνθετικής αυξίνης	ΣΙΤΗΡΑ Σιτάρι, Κριθάρι, Σίκαλη	ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΛΦΩΜΑΤΟΣ ΩΣ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΗΜΑΙΑΣ (BBCH 29-36)	75-150	20-40	ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ: ΑΓΡΙΟΒΙΚΟΣ, ΚΙΡΣΙΟ, ΠΑΠΑΡΟΥΝΑ, ΠΕΡΙΚΟΚΛΑΔΑ, ΡΑΠΑΝΙΔΑ		

Παρατηρήσεις: - Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά σκεύασμα και ανά καλή/κή περίοδο: 1 - Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τη χρήση τους ανατρέξτε στην ετικέτα/έγκριση των σκευασμάτων. - Να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ

CARMINA MAX	ΠΡΟΣΟΧΗ 	<ul style="list-style-type: none"> - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση περιέχει Chlorotoluron. - Υποπτο για πρόκληση καρκίνου. - Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο. - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. - Περιέχει μίγμα 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazole-3-one+2-methyl-2-Isothiazole-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. - Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
SARACEN SC	ΠΡΟΣΟΧΗ 	<ul style="list-style-type: none"> - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. - Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. - Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
SWORD 240EC	ΚΙΝΔΥΝΟΣ 	<ul style="list-style-type: none"> - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. - Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. - Περιέχει clodinafop-propargyl. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. - Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
LENTEMUL 60SL	ΚΙΝΔΥΝΟΣ 	<ul style="list-style-type: none"> - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. - Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
LIMCPA FORTE 50SL	ΚΙΝΔΥΝΟΣ 	<ul style="list-style-type: none"> - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. - Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.
CIRAN SL	ΚΙΝΔΥΝΟΣ 	<ul style="list-style-type: none"> - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις. - Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. - Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Κάτοχος της άδειας:

CARMINA MAX: GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.

SARACEN SC, SWORD 240EC, LENTEMUL 60SL,

LIMCPA FORTE 50SL, CIRAN SL: NUFARM GMBH & CO KG.



Αποκλειστική διανομή: K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ

ΕΔΡΑ: Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Τ.Κ. 570 22 Σίνδος, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 568656, φαξ. 2310 798423, E-mail: info@efthymiadis.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ: 1ο χλμ Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου, Τ.Θ. 13, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής

Τηλ. 22990 63830/63840, φαξ. 22990 63346, E-mail: info@efthymiadis.gr

