

ΧΑΛΚΟΥΧΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ





Nordox 75 WG






Nordox 75 WG

Πλεονεκτήματα

- Το μοναδικό οξείδιο του χαλκού στην αγορά.
- Το μοναδικό χαλκούχο σκεύασμα με χρώμα κόκκινο.
- Μεγάλη περιεκτικότητα σε χαλκό (75%).
- Μορφή τυποποίησης WG.
- Υψηλή καθαρότητα από βαρέα μέταλλα (FAO).
- Το 84% των κόκκων έχουν μέγεθος κάτω από τα 2 microns.
- Μεγάλος αριθμός κόκκων/γραμμάριο προϊόντος.
- Ιδιαίτερα υψηλή αντοχή στην έκπλυση.

Kocide® 2000

Ο ηγέτης των χαλκών



Kocide® 2000 – Δίνει αξία στα χρήματά σας

- Υψηλή βιοδιαθεσιμότητα χαλκού για υψηλότερη αποτελεσματικότητα και προστασία.
- Εύκολο στην ανάμιξη και τη μεταφορά.
- Άριστη συνδυαστικότητα.
- Μεγάλη αντοχή στην έκπλυση από την βροχή.
- Πληροί όλες τις προδιαγραφές της ΕΕ.
- Εκλεκτικό ως προς την καλλιέργεια.



ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

CHAMP[®] 37.5 WG **MACC Super[®] 36 SC**

Μυκητοκτόνα-Βακτηριοκτόνα επαφής
με προστατευτική δράση



**Ό,τι πολυτιμότερο
για την προστασία της
καλλιέργειάς σας!**

CHAMP[®] 37.5 WG

Μεταλλικός χαλκός σε ποσοστό 37.5% β/β

Βρέξιμοι Κόκκοι

Το **CHAMP[®] 37.5 WG** παρασκευάζεται με μία μοναδική διαδικασία πολυμερισμού (**MLP, Moisture Leveling Polymer Technology**), παρέχοντας **σωματίδια εξαιρετικά μικρής διαμέτρου** σε σχέση με τα χαλκούχα σκευάσματα της αγοράς και κόκκους ανθεκτικούς στην τριβή, ουσιαστικά **απαηλαγμένους από σκόνη (dry-prill)**.

- Δεν αφήνει υπολείμματα στη συσκευασία
- Δε δημιουργείται σκόνη κατά το άνοιγμα και άδειασμα της συσκευασίας
- Είναι εύκολο στη μεταφορά και στη δοσομέτρηση
- Παρουσιάζει εξαιρετική διάλυση και διασπορά στο νερό του ψεκαστικού διαλύματος, χωρίς να βουλώνουν τα μπεκ και τα φίλτρα





MACC Super[®] 36 SC

Μεταλλικός χαλκός σε ποσοστό 36% β/ο

Συμπυκνωμένο Εναιώρημα

Το **MACC Super[®] 36 SC** αποτελεί την εξελιγμένη μορφή τυποποίησης υδροξειδίου του χαλκού. Διαθέτει μία από τις **πιο** λεπτές κρυσταλλικές δομές σωματιδίων σε σχήμα βελόνας.

- Διασπείρεται εξαιρετικά στην ψεκαζόμενη φυτική επιφάνεια
- Είναι εύκολο στη μεταφορά και στη χρήση
- Παρουσιάζει εξαιρετική διάλυση στο νερό του ψεκαστικού διαλύματος
- Διατηρείται σε εναιώρημα για μεγάλο χρονικό διάστημα

CUPROXAT[®] SC


**«Ταράζει τα νερά»
στην αγορά των χαλκούχων προϊόντων
Φυτοπροστασίας**



CUPROXAT 19SC : Πλεονεκτήματα

- **Μεγαλύτερη και καλύτερη διάρκεια δράσης**
Εγγυάται εξαιρετική κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας.
- **Ευκολία και ασφάλεια κατά την εφαρμογή**
Αποφεύγεται η δημιουργία νέφους σκόνης που παρατηρείται κατά την εφαρμογή των συνήθων σκευασμάτων στερεής μορφής.
- **Άριστη ικανότητα σχηματισμού εναιωρήματος**
Εξασφαλίζει βέλτιστο κόστος εφαρμογής καθώς δεν δημιουργείται ίζημα κατά την ανάμιξη με νερό στο ψεκαστικό δοχείο.
- **Σταθερότητα κατά την αποθήκευση**
Το σκεύασμα λόγω της εξαιρετικής μορφής τυποποίησης του (συμπυκνωμένο εναιώρημα-SC), παραμένει σε άριστη κατάσταση για τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία παρασκευής του.
- **Καλή συνδυαστικότητα**
Καθότι, περιέχει ως μοναδικό διαλύτη το νερό και δεν φέρει χλώριο δύναται να συνδυαστεί με λοιπά φυτοπροστατευτικά προϊόντα*.

Επιλέξτε το κατάλληλο χαλκούχο σκεύασμα για την προστασία της καλλιέργειάς σας , μέσα από την ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων της K+N Ευθυμιάδη!



Ελιά

Λήθαργος
ΙΑΝ-ΦΕΒΡ

Διακοπή ληθάργου
ΜΑΡΤ-ΑΠΡΙΛ

Άνθιση
ΜΑΙΟΣ

Ανάπτυξη καρπών
ΙΟΥΝ-ΟΚΤ

Ωρίμανση
ΟΚΤ-ΔΕΚ

ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ

ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ

ΚΕΡΚΟΣΠΟΡΑ

ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ



Χειμώνας Έναρξη βλάστησης Σχηματισμός ταξιανθίας Φούσκωμα Στεφάνη-Άνθιση Πλήρη άνθιση Καρπόδεση Κόκκος σταριού Ξυλοποίηση πυρήνα Ωρίμανση

Οξειδίο του χαλκού:  **Nordox 75 WG**

Υδροξείδια του χαλκού: **Kocide®** **MACC Super® 36 sc** **CHAMP® 37.5 WG**

Τριβασικός θειϊκός χαλκός: **CUPROXAT® SC**

Οξυχλωριούχος χαλκός: **CUPRAVIT® OB 50 WP**

Μηλοειδή

Χειμώνας / Άνοιξη

Άνθιση

Ανάπτυξη καρπών

ΩΙΔΙΟ

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

ΒΑΚΤΗΡΙΑ



Άνοιγμα
οφθαλμών

Διόγκωση
οφθαλμών

Διαχωρισμός
ανθοταξιών

Ροζ
μπουμπούκια

Άνθιση

Πτώση
πετάλων

Καρπόδεση

Διόγκωση
καρπών

Ωρίμανση

Οξειδίο του χαλκού:  **Nordox 75 WG**

Υδροξείδια του χαλκού: **Kocide®** **MACC Super® 36 sc** **CHAMP® 37.5 WG**

Τριβασικός θειϊκός χαλκός: **CUPROXAT® SC**

Οξυχλωριούχος χαλκός: **CUPRAVIT® OB 50 WP**

Πυρηνόκαρπα

Χειμώνας / Άνοιξη

Άνθιση

Ανάπτυξη καρπών

ΚΟΡΥΝΕΟ

ΣΚΩΡΙΑΣΗ

ΕΞΩΑΣΚΟΣ

ΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΟ

ΩΙΔΙΟ

ΒΑΚΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΙΛΙΑ

ΜΟΝΙΛΙΑ



ΦΟΥΣΚΩΜΑ
ΜΑΤΙΩΝ

ΡΟΔΙΝΗ ΚΟΡΥΦΗ

ΑΝΘΙΣΗ-ΠΤΩΣΗ
ΠΕΤΑΛΩΝ

ΠΤΩΣΗ ΚΑΛΥΚΑ

ΜΕΣΑ ΜΑΙΟΥ

ΤΕΛΟΣ ΜΑΙΟΥ-
ΑΡΧΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΡΧΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΜΕΣΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΤΩΣΗ ΦΥΛΛΩΝ

Οξειδίο του χαλκού:  **Nordox 75 WG**

Υδροξείδια του χαλκού: **Kocide®** **MACC Super® 36 sc** **CHAMP® 37.5 WG**

Τριβασικός θειϊκός χαλκός: **CUPROXAT^{SC}**

Οξυχλωριούχος χαλκός: **CUPRAVIT® OB 50 WP**

Περονόσπορος (*Plasmopara viticola*), Ανθράκνωση (*Elsinoe ampelina*)
Βακτηριακή νέκρωση (*Xanthomonas ampelina*)



Υδροξείδια του χαλκού: **Kocide[®]** **MACC Super[®] 36 sc** **CHAMP[®] 37.5 WG**

Τριβασικός θειϊκός χαλκός: **CUPROXAT[®] SC**

Οξυχλωριούχος χαλκός: **CUPRAVIT[®] OB 50 WP**

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται
με ασφαλή τρόπο.

Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες
σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις
προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.



*Καλλιεργούμε αξία
Δημιουργούμε φυτοπροστασία!*