



Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο καλαμπόκι



**Κ.Β. Ευθυμιάδη
αβεε**

SAMSON[®]
Extra **6** OD

Προϊόν


ISK BIOSCIENCES

Διανομέας

 **Κ.Β. Ευθυμιάδη**
αβεε



Το SAMSON EXTRA 6OD περιέχει nicosulfuron 6 % β/ο (χημική ομάδα πυριμιδινυλσουλφονουρία) με μορφή σκευάσματος OD (Ελαιώδες εναιώρημα)




SAMSON[®]

Extra 6 OD

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το nicosulfuron αναστέλλει την δράση του ενζύμου *οξεικογαλακτική συνθετάση (ALS)*, που είναι απαραίτητο για την βιοσύνθεση ουσιωδών αμινοξέων στα φυτά. Και επειδή το ένζυμο αυτό δεν απαντάται στα ζώα και τον άνθρωπο, το προϊόν παρουσιάζει πολύ χαμηλή τοξικότητα.




SAMSON[®]

Extra 6 OD

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και μετακινείται στα ακραία μεριστώματα βλαστού και ρίζας

Αναστέλλει την αύξηση και προκαλεί αλλαγή του χρώματος των φυτών (ερυθρός μεταχρωματισμός), παραμόρφωση του φυλλώματος και τελικά το θάνατό τους




SAMSON[®]

Extra 6 OD

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

SAMSON[®]
Extra 6 OD



Μουχρίτσα:

Στο στάδιο από τα 2 φύλλα έως το αδελφωμα η δόση εφαρμογής του SAMSON EXTRA 6OD είναι 75 κ.εκ/στρ.



Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Σετάριας:

Στο στάδιο από τα 2 φύλλα έως το αδελφωμα η δόση εφαρμογής του SAMSON EXTRA 6OD είναι 75 κ.εκ/στρ.



Σετάριας (Setaria spp)



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Βέλιουρας:

Στο στάδιο από τα 2-6 φύλλα έως το αδελφωμα η δόση εφαρμογής του SAMSON EXTRA 6OD είναι 75 κ.εκ/στρ.



**Βέλιουρας από σπόρο και ρίζωμα
(Sorghum halepense)**



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Βλήτα:

Στο στάδιο από τα 2 φύλλα έως 6 φύλλα η δόση εφαρμογής του SAMSON EXTRA 6OD είναι 75 κ.εκ/στρ.



Βλήτα (Amaranthus spp)



ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Τάτουλας:

Στο στάδιο από τα 2 φύλλα έως 6 φύλλα η δόση εφαρμογής του SAMSON EXTRA 6OD είναι 75 κ.εκ/στρ.




Τάτουλας (Datura stramonium)

SAMSON[®] ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Extra 6 OD

Το SAMSON EXTRA 6OD εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά όταν το καλαμπόκι έχει από 2-8 φύλλα και τα ζιζάνια έχουν φυτρώσει.

SAMSON[®]
Extra 6 OD





SAMSON[®] ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Extra 6 OD

SAMSON[®]
Extra 6 OD


Nicosulfuron



Εξαιρετική βιολογική δράση,
καλύτερη των μορφών EC/SC.

Καλύτερη διαβροχή των φύλλων.
Μειώνει την εξάτμιση
Βελτιώνει την πρόσφυση
Αυξάνει την ποσότητα απορρόφησης της δ.ο

Το όφελος για τον παραγωγό
μεταφράζεται
σε αυξημένη βιολογική
δράση!



SAMSON[®]

Extra 6 OD

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ



SAMSON EXTRA



Nicosulfuron 4SC



Untreated




ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Το **SAMSON EXTRA 6OD** αποτελεί ένα **καινοτόμο** προϊόν της ISK Biosciences.
2. Όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά οδηγούν σε **εξαιρετική βιολογική δράση** με **βελτίωση της προσκόλλησης** της φυλλικής κάλυψης, της **αντοχής στην έκπλυση** από τη βροχή, της **διείσδυσης στα φύλλα**, καθώς επίσης και πιο **σταθερής δράσης** (υψηλότερη αρχική και μεγαλύτερη υπολειμματική δράση).
3. Οι βιολογικές ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, είναι **καλύτερα** των tank mix «SC / EC / SL + προσκολλητικό».
4. Αποτέλεσμα είναι η **μειωμένη επίδραση της θερμοκρασίας**, της **υγρασίας**, του **pH**, της **σκληρότητας του νερού**, της **ταχύτητας του ανέμου** και της **εξάτμισης** στην βιολογική δράση του σκευάσματος.

SAMSON[®]


Extra 6 OD

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



Το όφελος για τον παραγωγό μεταφράζεται σε αυξημένη βιολογική δράση!

Πρόταση ζιζανιοκτονίας Καλαμποκιού από την Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ




SUCCESSOR[®] T

**Successor-T δόση 300-340 κ.εκ/στρ.
Στην πράξη χρησιμοποιούν 400 κ.εκ/στρ**

**Samson Extra 6OD 750 κ.εκ+ Clue 100SC 1000 κ.εκ/500
λίτρα (12 στρ)**

SAMSON[®] Extra 6 OD + CLUE 100 SC

**Samson Extra 6OD 750 κ.εκ+ Clue 100SC 750 κ.εκ +
Buctril 22,5EC 500 κ.εκ/500 λίτρα (12 στρ)**

SAMSON[®] Extra 6 OD + CLUE 100 SC + Buctril[®] 22,5 EC

**Samson Extra 6OD 750 κ.εκ+ Starane Gold 1,5 λίτρα/500
λίτρα (12 στρ)**

SAMSON[®] Extra 6 OD + STARANE[®] GOLD

**Samson Extra 6OD 750 κ.εκ+ Buctril 22,5EC 1500 κ.εκ/500
λίτρα (12 στρ)**

SAMSON[®] Extra 6 OD + Buctril[®] 22,5 EC